

Informe del Uso de Drogas en las Américas

Marya Hynes, M.H.S.

OID/CICAD



Organización de los Estados Americanos

Marzo, Bogotá, Colombia 2012



El Observatorio Interamericano sobre Drogas: Antecedentes

- Uno de las Líneas de Acción originales desde la creación de la CICAD en 1986
- Originalmente nombrado el Banco De Datos sobre el Consumo y Trafico de Drogas
- Fue re-establecido en 2000 a la petición de los Estados Miembros, como el *Observatorio Interamericano sobre Drogas*
 - la rama de estadística, información e investigación de la CICAD.



“El trabajo más estimulante e innovador del Observatorio Interamericano será el análisis de las estadísticas y demás información con el fin de entender mejor las tendencias a través del tiempo y las conexiones intersectoriales entre las diferentes áreas del control de drogas ilícitas...

El Observatorio publicará informes que muestren las tendencias en la región y que examinen las posibles variables relacionadas.”

Proposal to Establish the Inter-American Observatory on Drugs, XXVI
Regular Session of CICAD, October 1999, Montevideo,



El OID se consolidará como referente fundamental de información y estadísticas hemisféricas sobre drogas al servicio de los países miembros de la CICAD y de sus instituciones y ciudadanos, actuando como herramienta para:

- La elaboración de un informe anual de la situación de las drogas en el Hemisferio será una de sus principales obligaciones,
- Informes estadísticos
- Publicación de los resultados de los estudios del OID
- Informes sobre actividades, comunicados de prensa y otras publicaciones

Fortalecimiento del Observatorio Interamericano sobre Drogas: un modelo integral de Observatorio Interamericano sobre Drogas, CICAD, Junio 2002



Estrategia sobre drogas del Hemisferio

- Estrategia hemisférica sobre drogas, aprobada por los países el año 2010
- Plan de acción 2011-2015, adoptada por la comisión y los países el 2011



Eje central de la estrategia

- Desarrollarán e implementarán políticas nacionales sobre drogas basadas en evidencias.
- Promover relaciones con comunidad científica para el diseño, implementación, actualización y evaluación de las políticas nacionales.
- Recopilación de información y metodologías que permitan (cuando sea posible) la comparación de datos entre países.



Enfoque del Informe

- Proveer una mirada analítica sobre el uso de drogas en el hemisferio
- Examinar las tendencias y patrones de uso de drogas a nivel regional por *droga*, no por país.
- Contiene estadísticas hasta el año 2009



Desarrollo y elaboración

- Apoyo substantivo de SEDRONAR, Argentina
- Datos proveídos por Observatorios Nacionales
- Comité de diseño y redacción con personas de las otras secciones de la CICAD.
 - MEM
 - Reducción de la Oferta
 - Lavado de Dinero
 - Fortalecimiento Institucional



Revisión de Pares

- El informe fue sujeto de dos procesos de revisión de pares
 - 2009-2010 a través de la REDLA, con revisores adicionales de los 2 consejos de drogas del Caribe, y la Universidad de Michigan de la EEUU
 - Primera revisión abordó el análisis técnico, redacción política, y contenido lingüístico
 - Después de tomar en cuenta las recomendaciones,
 - Se realiza la Segunda Revisión de pares 2010-2011



Ajustes basadas en la revisión de pares

- Evitar gráficos que promuevan la comparación directa entre prevalencia de los países
- Enfoque sobre las tendencias
- Mayor análisis profundo i.e. consumo riesgoso de alcohol, análisis de razón de tasas (además de prevalencia) etc.
 - Se espera tener mayor análisis de esta naturaleza en los informes futuros.



Algunos Comentarios comunes del proceso

- Algunos revisores comentaron que fue la primera vez que vieron la información de su país en forma publicada notando que ha sido un esfuerzo positivo para el país.
- El proceso de revisión también estimuló a varios países a buscar y enviar información adicional de su país.
 - Fomentó mayor participación de los países



¿Qué dice el informe? Principales Conclusiones

- Diversidad del problemática de drogas en todo el hemisferio.
- El alcohol es la substancia psicoactiva mas consumida en el hemisferio
 - Sin embargo, las tasas de consumo riesgoso se encuentran en países de prevalencia baja
 - Entre estudiantes secundario el comportamiento del “binge drinking” debería ser una preocupación para todos los países
- La marihuana es la droga ilícita de mayor consumo en la región
 - Patron subregional: en varios países Caribeños el consumo de marihuana entre los estudiantes secundarios excede el consumo de tabaco



¿Qué dice el informe? Principales Conclusiones

- Inhalables: el consumo de inhalables se encuentra firmemente en la población escolar en varios países Latinoamericanos y Caribeños
 - Múltiples países muestran prevalencia de consumo de inhalables mayor que la prevalencia de marihuana
 - Población universitaria: alta prevalencia entre mujeres (informes países CAN, DROSICAN)



Qué dice el informe? Principales Conclusiones

- Cocaína: el consumo se ha extendido a todos los países del hemisferio
 - Problema preocupante para el cono sur
 - Prevalencia de cocaína en algunos países Caribeños y Sudamericanos excede prevalencia en los EE.UU.
 - La tendencia en America del norte esta en descenso, pero en el Cono Sur la tendencia no parece ser en la misma dirección.
- Pasta Base de Cocaína y sus variantes
 - Problema aguda en el cono sur
 - A pesar de mostrar prevalencia relativamente baja en comparación con otras drogas ilícitas, el impacto sobre el área sanitaria parece ser mayor



Qué dice el informe? Principales Conclusiones

- Fármacos: el consumo de sin receta médica es prevalente, sobre todo en los países con baja prevalencia del consumo de drogas ilícitas



Qué dice el informe? Principales Conclusiones

- Queda claro que en los países donde la percepción de riesgo de consumo de drogas es baja, se encuentran prevalencia del consumo más alta
- En el mismo sentido, donde se percibe que el acceso a las drogas es fácil, igualmente se encuentran prevalencia de consumo más alto
- Estas áreas podrían ser posibles niveles de intervención primaria para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas



- Capítulo 1 Alcohol
- Capítulo 2 Marihuana
- Capítulo 3 Inhalables
- Capítulo 4 Cocaína HCL, Pasta de Coca, Pasta Básica de Cocaína y otros sustancias fumables que contienen alcaloides de cocaína
- Capítulo 5 El Uso Indebido de Fármacos sin Receta Medica
- Capítulo 6 Otros Temas
 - Percepción de Riesgo,
 - Acceso a Drogas Percibida,
 - Tratamiento sobre Drogas




Gráfico 2. Razón de la prevalencia de último mes de consumo de marihuana y tabaco, entre estudiantes secundarios.
Nota: El gráfico muestra los datos disponibles de los distintos países. Los países sin datos comparables no están representados.




Gráfico 11. Prevalencia de último mes de consumo de inhalables entre estudiantes secundarios, por sexo.

Nota: Los datos de Estados Unidos se han tomado del estudio de 2009 y corresponden al 10º grado solamente, ya que los resultados para la población total no están disponibles. El gráfico muestra los datos disponibles de los distintos países. Los países sin datos comparables no están representados.




Gráfico 15. Prevalencia de último año de consumo de cocaína entre estudiantes secundarios, Uruguay, 2003-2009.
Fuente: JND




Gráfico 13. Prevalencia de último año de consumo de cocaína entre estudiantes secundarios, Argentina, 2001-2009.
Fuente: SEDRONAR




Gráfico 14. Prevalencia de último año de consumo de cocaína entre estudiantes secundarios, Chile, 2001-2009.
Fuente: CONACE




Gráfico 16. Prevalencia de último año de consumo de cocaína entre estudiantes secundarios, Estados Unidos, 2001-2009.
Fuente: MTF, Johnston et al (2010)




Gráfico 19. Razón de la prevalencia de último año de consumo de PBC, hombres y mujeres, entre estudiantes secundarios, por país y año.

Nota: La tabla muestra los datos disponibles por país. Los países sin datos comparables no están representados.




Gráfico 20. Prevalencia de último año de consumo de PBC entre estudiantes secundarios, Argentina, 2001-2009.

Fuente: SEDRONAR.




Gráfico 21. Prevalencia de último año de consumo de PBC entre estudiantes secundarios, Chile, 2001-2009.
Fuente: CONACE




Gráfico 22. Prevalencia de último año de consumo de PBC entre estudiantes secundarios, Uruguay, 2003-2009.
Fuente: JND




Gráfico 23. Prevalencia de vida, último año y último mes de consumo de tranquilizantes sin prescripción médica, entre estudiantes secundarios.

Fuentes: CNDs y ONDs en los Estados miembros.

Nota: Las cifras muestran los datos disponibles de los países. Los países sin datos comparables no están representados.




Gráfico 24. Prevalencia Vida, Último Año y Mes de Uso de Estimulantes sin prescripción médica, entre Estudiantes Secundarios.

Nota: Las cifras muestran los datos disponibles de los países. Los países sin datos comparables no están representados.




Gráfico 25 Prevalencia de último año de consumo de marihuana y percepción de riesgo asociado con consumo “frecuente” de marihuana en la población general de 15 a 64 años, en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay.

Nota: Prevalencia ajustada por edad y sexo. El gráfico muestra los datos disponibles de los distintos países a través del programa SIDUC.




Gráfico 26. Prevalencia de último año de uso de marihuana y percepción de fácil acceso en la población general de 15 a 64 años, por país.

Nota: Prevalencia ajustada por edad y sexo. El gráfico muestra los datos disponibles de los distintos países a través del programa SIDUC.



Próximo informe

- Compromisos de países?
- Con que periodicidad?
- Análisis adicionales?
- Temas adicionales
 - Drogas de síntesis
 - Drogas nuevas
 - Impacto en el Tratamiento



Organización de los
Estados Americanos

¡Muchas Gracias!

Marya Hynes M.H.S.

Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID)

mhynes@oas.org