



ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS

cicad

CUADRAGESIMO SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
Del 27 al 30 Noviembre, 2007
Santa Marta, Colombia

OEASer.L/XIV.2.42
CICAD/doc.1615/07
28 Noviembre 2007
Original: Español

MODELO MULTIDIMENSIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES Y LA VIOLENCIA FAMILIAR

Ps. Carmen Fernández
Directora General de Operación

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS, WASHINGTON, D.C. 20006



Centros de
Integración
Juvenil, A.C.

Modelo Multidimensional para la atención de las Adicciones y la violencia familiar

- Unidades de Internamiento
- Unidades de Consulta Externa y Prevención

Ps. Carmen Fernández
Directora General de Operación



Instrumentos Internacionales

- 1975. 1a. Conferencia Mundial de la Mujer. (México). Año Internacional de la Mujer.
- 1981. Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
- 1994. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará- OEA). México ratificó en 1998.

Familias en México

Actualmente existen 25 millones de familias

- 16.9 millones de hogares nucleares.
- 5.8 millones de hogares extensos.
- 5.7 millones de jefatura femenina.
- 4.8 millones monoparentales.
- 2.5 millones de hogares integrados por amigos que viven juntos, personas solas y parejas homosexuales.

Fuente: INEGI. Hogares por sexo del jefe, tipo y clase de hogar, 2005.

Violencia familiar

- El 50% de los hogares existe violencia intrafamiliar (ENDIREH, INEGI, INMUJERES, UNIFEM).
- El 67% de las mujeres ha sido objeto de algún tipo de violencia en los últimos 12 meses.
- 1 de cada 3 niños de 6 a 9 años de edad, reportan ser tratados con violencia en su familia. (Consulta Infantil y Juvenil, INEGI, 2000).
- Los niños sufren de mayor violencia física por parte de sus padres que las niñas y maltrato físico severo (20.1% y 11.3%) y las niñas sufren de mayor abuso sexual (4.3% y 2.1%) (INMUJERES, INP, 2006).

Estudios multipaís sobre salud de la mujer y violencia

- Mujeres víctimas de violencia de pareja tienen mayores problemas de salud en general y de salud mental.
Depresión, angustia y comportamientos suicidas.
- Recomendaciones: investigaciones de causas, consecuencias y costos. Prevención y atención a víctimas y victimarios (OMS, 2005).


Principales causas de AVISA perdidos por sexo

Num	Mujeres	%	Num.	Hombres	%
1.	Depresión unipolar mayor	6.5	1.	Afecciones originadas en el periodo perinatal	5.9
2.	Diabetes mellitus	6.3	2.	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	5.1
3.	Afecciones originadas en el periodo perinatal	5.3	3.	<u>Uso de alcohol</u>	4.8
4.	Anomalías congénitas	4.3	4.	Agresiones (homicidios)	4.6
5.	Enfermedades isquémicas del corazón	2.8	5.	Accidentes de vehículo de motor (tránsito)	4.6
6.	Osteoartritis	2.3	6.	Diabetes mellitus	4.5
7.	Cataratas	2.2	7.	Anomalías congénitas	4.0
8.	Enfermedad cerebrovascular	2.2	8.	Enfermedades isquémicas del corazón	3.5
9.	Demencia y enf. Alzheimer	2.1	9.	Depresión unipolar mayor	2.6
10.	Asma	2.0	10.	Peatón lesionado en AVM	2.2
Total (Millones)			Total (Millones)		

Fuente: Salud: México (2006) DGIS/SS. Cuadro 21


Usuarios de drogas de nuevo ingreso atendidos en CIJ, 1990-2006

Total de casos 2006 35 mil y 40 mil familiares




Fuente: SIIECD. CIJ 2006

Consumo de alcohol y tabaco AV, en pacientes atendidas en CIJ, 1996-2006



Fuente: SIIECD, 2006, CIJ

Consumo de drogas AV en pacientes de CIJ, (1990-2006)



Fuente: SIIECD 1990-2006/1, CIJ

Estados con tasas de uso alguna vez en la vida de Metanfetaminas superiores a la media nacional (15.3%)
Usuarios en tratamiento CIJ, segundo semestre 2006




Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2006.

Estados con tasas de uso alguna vez en la vida de Heroína superiores a la media nacional (4.3%)
Usuarios en tratamiento CIJ, segundo semestre 2006



Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2006.

Consumo AV de alcohol y tabaco entre estudiantes de educación media y media superior del DF



Consumo de drogas y violencia familiar

- El consumo nocivo de alcohol es un factor de riesgo para todos los tipos de violencia interpersonal (OMS, 2000).
- 55% de los padres de niños maltratados presentaron abuso de alcohol y/o drogas. 45% refirieron haber sido maltratados en su niñez (UNICEF, 2003).
- 23% de los niños maltratados lo atribuyen a que sus padres consumen alcohol o drogas (IFE, 2003).
- Violencia y drogas son los mayores problemas enfrentados por las mujeres en latinoamérica. El abuso de drogas aumenta la violencia contra las mujeres. (CICAD, 2007)

Violencia y Adicciones

Problemas articulados con graves costos sociales:

- El 63% de los actos delictivos cometidos por *jóvenes* se comenten bajo el influjo de alcohol y otras drogas (SISVEA,2002).
- El 41% de los delitos se cometen bajo los efectos del alcohol o drogas (II Encuesta Nacional de Seguridad, 2002).
- Primera causa de muerte en jóvenes: accidentes asociados al consumo de alcohol (SSA,2006).
- Incremento de embarazo adolescente entre 12 y 19 años de edad (600 mil embarazos 2006)

Factores familiares asociados al uso de drogas

CIJ, Subdirección de Investigación, 2001- 2005

- Consumo de drogas ilícitas en estudiantes asociado con el uso de sustancias por parte de uno o ambos padres y violencia familiar (n=6,200).
- El abuso sexual entre los 5 y 9 años de edad, es un antecedente común en mujeres adolescentes consumidoras.
- Abuso de alcohol paterno, depresión materna y relaciones de pareja violentas. Repetición transgeneracional. Pobre nutrición afectiva.

GOLDBERG, AUDIT Y DUSI

	Paciente Identificado		Madre		Padre	
	Media	D. S.	Media	D. S.	Media	D. S.
Ansiedad	3.6	3.1	6.1	2.4	3.2	2.0
Depresión	2.7	2.9	4.4	2.2	1.3	1.7
Abuso alcohol	4.8	3.6	3	2.8	5.0	3.8
Dependencia alcohol	1.8	2.2	.1	.4	1.8	2.3
Consumo Nocivo alcohol	2.6	3.0	1	1.6	2.6	2.9
Severidad CD.	4.3	2.4	.7	.8	2.2	1.9

CIJ, Subdirección de Investigación, 2005

Factores asociados al consumo

- Consumo en mujeres se asocia a depresión, soledad, estrés y al control del peso. Los hombres lo reportan como estimulante.
- Las mujeres adultas inician el consumo de alcohol y drogas de uso médico asociado a estados depresivos.
- El consumo de alcohol en hombres está asociado a procesos de identidad masculina, pérdida de empleo y bajo salario.
- La depresión femenina asociada a sometimiento, estrés laboral y falta de apoyo afectivo y la depresión masculina asociada a fracaso laboral.

Estudio sobre el consumo de drogas y violencia doméstica entre familias (CIJ-ILEF, 2005)

Grupo 1: Casos atendidos por violencia doméstica en CAVIDA-ILEF

Grupo 2: Casos atendidos por adicciones en CIJ

Todos los casos presentaban ambos problemas

El grupo 1 no reconocía que el abuso de alcohol y/o drogas

El grupo 2 no identificaban la violencia en sus relaciones familiares


Violencia de pareja en mujeres atendidas en CIJ

Grupo 1: Parejas de no usuarios

Grupo 2: Parejas de usuarios Edad: 34-38 años

	Grupo 1 (%)	Grupo 2 (%)
Casadas/unión libre	82.3	82.7
Hogar	41.9	43.0
Trabaja	56.4	56.7
Violencia Alguna vez	68.4	87.4
Violencia de pareja actual	35.5	73.3
Ha usado alcohol	10.6	21.7
Ha usado DUM o ilegales	13.2	22.7

Modelo de Terapia Familiar Multidimensional con Perspectiva de Género



- Teoría de la complejidad
- *Construccionismo social*
- Teoría de género
- Teoría de TF Sistémica
- Narrativa
- Abordaje Psicoeducativo
- *Abordaje ecológico*

Objetivos

- Promover un cambio **holístico** en la familia.
- **Suprimir** o reducir el consumo de drogas y modificar pautas relacionales de violencia.
- **Reestructurar** las pautas de relación familiar para generar nuevas formas de organización.
- **Co-construir** relatos de género alternativos en la familia.
- Asegurar la **nutrición afectiva** entre los integrantes.
- Ampliar las **redes de apoyo** social de la familia.

Construccionismo

- Las verdades son consensos en los grupos humanos.
- La realidad es una construcción consensuada a través del lenguaje.
- El consenso lo construye el discurso dominante.



Redes de Apoyo Social

- Ampliar prácticas identitarias para el sujeto distintas de su grupo de pares.
- Apoyar estilos de vida saludables-

⇒ Centro de Día



Resultados y Eficacia

- Estudio piloto inicial en seis ciudades (n=12). Actualmente en toda la República (n=40).
- Todas las familias concluyeron su tratamiento.
- En todos los casos hubo remisión total del consumo de drogas.
- Se deconstruyeron los discursos familiares que sostenían los constructos normativos de género.
- Las pautas relaciones violentas desaparecieron.
- Seguimiento a los 12 meses. Permanencia de los cambios.

Violencia familiar y Adicciones: Recomendaciones Preventivas



- Derechos Humanos de las mujeres y de la niñez
- Negociación y resolución de conflictos
- Habilidades para la vida
- Construcción de nuevas masculinidades y feminidades
- Parentalidad sin violencia
- Fortalecimiento de redes sociales

Conclusiones y Recomendaciones

- Son problemas de salud pública y de derechos humanos.
- Además de enunciar los derechos, es necesario exigirlos.
- La sola denuncia no resuelve el problema.
- Prevención y Tratamiento son prioridades.
- Investigación y formación de recursos humanos especializados.