



17th St. & Constitution Avenue N.W.  
Washington, D.C. 20006  
Estados Unidos de América

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000  
[www.oas.org](http://www.oas.org)

**COMISION INTERAMERICANA PARA EL  
CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS  
CICAD**

Secretaría de Seguridad Multidimensional

**QUINGUAGÉSIMO CUARTO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES  
Del 11 al 13 de diciembre de 2013  
Bogotá, Colombia**

**OEA/Ser.L/XIV.2.54  
CICAD/doc.2056/13  
10 diciembre 2013  
Original: English**

**IMPORTANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO  
DR. FERNANDO CANO, CONADIC, MEXICO**

**70**  
AÑOS  
1943 - 2013  
A FAVOR DE LA SALUD

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**CONADIC**  
Comisión Nacional contra las Adicciones

# **CICAD**



## **COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS**

### **54º PERIODO ORDINARIO DE SESIONES**



**Bogotá, Colombia**  
**Diciembre de 2013**

**La evidencia científica sustenta cada vez más la relación estrecha que existe entre el funcionamiento de diferentes estructuras cerebrales y las conductas asociadas al consumo de drogas**

# EL CONSUMO DE DROGAS Y SU INTERACCIÓN CON OTROS FACTORES



Alcohol  
+ Tabaco  
Drogas



Familia

Sociedad

Medio ambiente


Comorbilidades

Factores psicológicos


Genética



Adicción



Consumo sin adicción



Suspensión del consumo

**Independientemente de las alteraciones cerebrales provocadas por la adicción, existen otras consecuencias a la salud que incrementan la morbi-mortalidad de las personas que consumen drogas**

# PRINCIPALES DAÑOS A LA SALUD POR DROGAS LEGALES

## Alcohol

- El consumo de alcohol es el principal factor causal de más de 60 tipos de enfermedades y lesiones y es el responsable de aproximadamente 2,5 millones de muertes en el mundo cada año
- Los trastornos por uso de alcohol ocupan el lugar número 15 de causas de años vividos con discapacidad a nivel mundial y el 16 en la región que se encuentra México

## Tabaco

- El consumo de tabaco mata a más de 5 millones de personas al año
- Entre los cinco principales factores de riesgo de mortalidad, es la causa de muerte más prevenible
- El 11% de las muertes por cardiopatía isquémica, la principal causa mundial de muerte, son atribuibles al consumo de tabaco. Más del 70% de las muertes por cáncer de pulmón, bronquios y tráquea son atribuibles al consumo de tabaco

Teo Vos, Abraham D Flaxman, et al. Years lived with disability (YLDs) for 1160 sequelae of 289 diseases and injuries 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 380 DECEMBER 15/22/29,2012

# PRINCIPALES DAÑOS A LA SALUD POR DROGAS ILEGALES



## Mariguana

- Regulación emocional (síntomas depresivos y conducta suicida)
- Cognición (memoria, atención)
- Percepciones (alucinaciones e ideas delirantes)
- Sistemas cardiocirculatorio y respiratorio



## Cocaína

- Regulación emocional (síntomas depresivos y ansiosos)
- Percepciones (alucinaciones e ideas delirantes)
- Cognición (memoria, atención) e impulsividad
- Sistema cardiocirculatorio (EVC, infarto al miocardio, arritmias)



## Heroína

- Importante potencial adictivo (físico y psicológico)
- Muertes por sobredosis
- Infecciones por compartir jeringas
- Síndrome de abstinencia marcado



## Inhalables

- Regulación emocional (síntomas depresivos y ansiosos)
- Percepciones (alucinaciones e ideas delirantes)
- Cognición (memoria, atención)
- Alteraciones musculares, cardíacas y pulmonares

Teo Vos, Abraham D Flaxman, et al. Years lived with disability (YLDs) for 1160 sequelae of 289 diseases and injuries 1990-2010: a systematic analysis for the Global Buren of Disease Study 2010. Lancet 380 DECEMBER 15/22/29,2012

# LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE LAS ADICCIONES

## Consumo de sustancias



Depresión  
Suicidio



Problemas familiares



Desempleo



Morbilidad



Accidentes  
Conductas delictivas




Mortalidad


# PRECEPTOS FUNDAMENTALES



**Política Pública con Estrategias Complementarias**



**Federalismo Articulado**



**Coordinación Intersectorial**

# LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE LAS ADICCIONES

**Criminalización**

**Legalización**

**VS**


**Prevención y Tratamiento  
Basado en la evidencia científica**

*“La adicción es una enfermedad, que puede ser diagnosticada y tratada”*


G. Kerlikowske

Sin embargo, sólo el 10% recibe tratamiento


# LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE LAS ADICCIONES



# Es fundamental proteger a los adolescentes




La evidencia demuestra que la probabilidad de avanzar del uso a la dependencia, es más alta cuando la exposición a las drogas acontece en la adolescencia

- 
- A map of North America is shown in the background, with callout boxes pointing to the United States and Canada. The callout boxes contain the following text:
- Más del 10% de las personas usuarias de drogas inyectadas (UDI's) en el mundo residen en Canadá y EEUU.
  - A nivel global, los EEUU tiene una de las poblaciones más altas de usuarios de drogas inyectadas
  - Los UDI's en EEUU representan al 9% de los nuevos casos de VIH (2009)


# COLORADO

## Servicios de Tratamiento



# COLORADO


## entre los Estados con altos índices en:



MEDICIONES	Grupos de Edad
Uso de Drogas Ilícitas en el mes pasado	12+, 26+
Uso de Marihuana en el año pasado	12-17
Déficit en Percepción de Riesgo asociada al uso de Marihuana una o dos veces en el mes	12+, 26+
Uso de en el mes pasado de droga diferente a marihuana	18-25
Uso de Cocaína en el año pasado	12+,18-25, 26+
Uso de Alcohol en el mes pasado	12+, 26+
Déficit en Percepción de riesgo asociado al consumo excesivo de alcohol una o dos veces por semana	12-17

# WASHINGTON

## Servicios de Tratamiento




Substance Abuse and Mental Health Services Administration

# SAMHSA

www.samhsa.gov • 1-877-SAMHSA-7 (1-877-726-4727)

# WASHINGTON



**Mantiene prevalencias encima o en la media nacional respecto a consumo de tabaco, alcohol y otras drogas.**

## **Puntos a considerar como Áreas de Mejora**

- **En 2012, en los EEUU, el número de personas de 12 años o más que necesitan de tratamiento contra el consumo de drogas fue de 8 millones (3.1% de su población total).**
- **De los 8 millones de personas, sólo 1.5 millones (0.6% de la población total y 19.1% de los que requerían el tratamiento) recibieron tratamiento especializado**
- **6.5 millones de personas necesitan tratamiento pero no lo recibieron**
- **1 millón de adolescentes de 12 a 17 años necesitaban tratamiento , sólo 121 mil recibieron el tratamiento (11.6%).**

**70**  
AÑOS  
1943 - 2013  
A FAVOR DE LA SALUD

**SALUD**

SECRETARÍA DE SALUD



**CONADIC**

Comisión Nacional contra las Adicciones

**DR. FERNANDO CANO VALLE**

**Comisionado Nacional contra las Adicciones**

**Secretaría de Salud**

**[www.conadic.com.mx](http://www.conadic.com.mx)**