

Heroína, Fentanilo y otros opioides en las Américas



OAS | More rights
for more people



OAS

More rights
for more people

Antecedentes del problema

- Nos remite a Europa y más recientemente a Estados Unidos
- Indicios de problemas de consumo de heroína y otros opioides en algunos países del Caribe (Rep. Dominicana), de América Central (Guatemala), América del Sur (Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay) y América del Norte (México)
- Desde el OID se está iniciando un Proyecto de trabajo con algunos países de AL y del Caribe para generar información válida y oportuna sobre este tema de manera de orientar futuras acciones de prevención, tratamiento e investigación.



OAS

More rights
for more people

Breve resumen sobre estas drogas

- **Opioides:** clases de drogas que incluye a la heroína ilegal, opioides sintéticos como el fentanilo y analgésicos de curso legal, consumidos bajo prescripción médica tales como oxicodona, hidrocodona, codeína, morfina y otros.

Los opioides trabajan sobre los receptores cerebrales vinculados al control del dolor y de las emociones. Cuando los medicamentos o sustancias opioides se unen a estos receptores aumentan los niveles de dopamina en las áreas de recompensa del cerebro produciendo euforia y relajación. Debido a que los receptores opioides también se encuentran en las áreas del cerebro que controlan la frecuencia respiratoria, la alta dosis puede provocar un cese respiratorio.

Otros efectos de los opioides: somnolencia, náuseas, confusión, sedación, depresión respiratoria, inconciencia y muerte.



OAS

More rights
for more people

Continuación..

- **Heroína:** droga opioide tomada de la morfina que se encuentra en la vaina de cierto tipo de amapolas, plantas que se cultivan en el sudeste y sudoeste asiático, en México y en Colombia. Puede ser un polvo blanco o marrón o una sustancia pegajosa. En alto grado de pureza puede fumarse o esnifarse. Pero la heroína impura se disuelve y se inyecta por vena o músculo.
- **Fentanilo:** poderoso analgésico opioide sintético similar a la morfina pero 50 o 100 veces más potente. Es una droga controlada y es comúnmente utilizada para el Tx del dolor severo o para aquellos pacientes que no toleran otros opiáceos.

Se presenta bajo **medicamentos de curso legal** (Actiq, Duragesic, Sublimaze): vía inyectable, parches o pastillas.

Fentanilos no farmacéuticos: o en la calle mezclada con heroína o con cocaína (China Gril, Apache, China White, Dance Fever, Friend, Goodfella, TNT, etc.). Polvos, tabletas, pinchadas en papel secante mezclado con heroína. Pueden inhalar, inyectar o absorber mediante las mucosas de la boca.

- **Informe Mundial de Drogas. ONUDC (2017):**

Opioides es la sustancia de mayor daño por las sobredosis, ETS y comorbilidad médica y psiquiátrica.

De los 17 millones de años de vida sana perdidos, el 70% le corresponde a los opioides. 35 millones de consumidores en el último año (2015), tercera droga de consumo a nivel global, luego de cannabis y anfetaminas y estimulantes.

- **Estados Unidos:**

- 1999-2015 se triplicaron las muertes por sobredosis, ocupando el primer lugar como causa de muerte. Se iniciaron con medicamentos bajo prescripción.
- El consumo de heroína ha crecido desde el 2007.
- Encuesta Nacional (2016): 948,000 usuarios de heroína, adultos jóvenes de 18-25 años. Incidencia alta en 2016: 170,000 nuevos consumidores.



- **Informe Europeo sobre Drogas (2017):**

- Europa: dos oleadas de consumo: a mediados de los ´70 en los países occidentales y a mediados y fines de los ´90 en los países centrales y orientales.
- El 80% de la demanda de Tx por opioides es por heroína y el 20% por medicamentos para su tx (metadona)
- El 81% de las muertes por sobredosis está relacionada a opioides y en incremento últimos 3 años.
- 1.3 millones de usuarios de opioides de alto riesgo (0,4% prevalencia anual-2015): Alemana, Fcia, GB, España, Italia.
- El 38% de la demanda de Tx es por opioides. Ya no es tan evidente el descenso en la demanda de Tx que se observaba desde el 2007.
- Gran preocupación por la aparición de opioides sintéticos, principalmente los derivados del fentanilo. Se venden en el mercado ilícito, on line y a veces como heroína.
- Gran preocupación por el aumento del consumo de opioides sintéticos de curso legal: metadona, buprenorfina, fentanilo, codeína, tramadol, morfina y oxicodona.



OAS

More rights
for more people

“Programa de Estudio sobre Heroína, Fentanyl y otros Opioides en las Américas” OID-CICAD-OEA

Países participantes: Argentina, Colombia, Ecuador, México, Perú, Rep. Dominicana y Uruguay

Objetivo general

Brindar asistencia a los países participantes en el desarrollo de políticas basadas en evidencia para dar respuesta al creciente problema de heroína, fentanyl y opioides en la región, a través de la implementación de apropiadas investigaciones en áreas clave relativas al consumo de heroína, fentanyl y otros opioides.



OAS

More rights
for more people

Objetivos específicos

- Sentar las bases para el armado de una red de instituciones, investigadores y expertos nacionales sobre la problemática de la “heroína, fentanyl y opioides” en el Hemisferio, para el abordaje conjunto, coordinado y eficiente de acciones y programas de investigación e intervención en prevención y asistencia.
- Apoyar y fortalecer los sistemas de alerta temprana existentes y promover la implementación cuando no existan.
- Fortalecer a los Observatorios Nacionales de Drogas en la gestión de la investigación y en el desarrollo de investigaciones específicas.



OAS

More rights
for more people

Objetivos específicos

- Avanzar en el conocimiento sobre diferentes aspectos de este problema para el diseño de intervenciones específicas, puntualmente:
 - I. Conocer la **caracterización química de opiáceos y opioides** incautadas en los países participantes, para estimar los niveles de pureza y los tipos de adulterantes presentes.
 - II. Conocer el **perfil sociodemográfico y de consumo de usuarios** de heroína, fentanyl y otros opiáceos y en lo posible estimar su magnitud a partir de metodologías específicas.
 - III. Describir el perfil sociodemográfico y de consumo de **los pacientes en tratamiento** por consumo de heroína, fentanyl y otros opiáceos y evaluar sus cambios a partir del seguimiento en un período razonable.



OAS

More rights
for more people

Graciela Ahumada – Consultora OID
gahumada@oas.org