



ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS



CUADRAGESIMO SEGUNDO PERIODO ORDINARIO
DE SESIONES
Del 27 – 30 noviembre, 2007
Santa Marta, Colombia

OEASer.L/XIV.2.42
CICAD/doc. 1578/07
25 noviembre 2007
Original: inglés

INSTITUTO NACIONAL SOBRE EL ABUSO DE DROGAS
GRUPO DE TRABAJO DE EPIDEMIOLOGÍA DE LA
COMUNIDAD (CEWG)


JAMES HALL

SECRETARÍA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, WASHINGTON, D.C. 20006

Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas
Grupo de Trabajo de Epidemiología de la
Comunidad (CEWG, por sus siglas en inglés)



Jim Hall
Centro para el Estudio y la
Prevención del Abuso de Sustancias
Nova Southeastern University
Davie, Florida EE.UU.



Grupo de Trabajo de Epidemiología de la Comunidad del NIDA


Reunión Semestral N° 62 – Junio de 2007

A map of the United States with 22 locations marked by stars. The locations are: Seattle, Minneapolis/St. Paul, Boston, New York, Philadelphia, Baltimore, D.C., Detroit, Chicago, St. Louis, Atlanta, Miami/Ft. Lauderdale, Texas, San Francisco, Denver, Phoenix, San Diego, Los Angeles, San Francisco, Honolulu, and Phoenix. The map is titled 'Grupo de Trabajo de Epidemiología de la Comunidad del NIDA'.

Misión:
Hacer un seguimiento de las tendencias en abuso de drogas mediante el rastreo de fuentes de datos actuales dentro y a lo largo de 22 áreas locales en EE.UU.

4

Grupo de Trabajo de Epidemiología de la Comunidad del NIDA
Reunión Semestral N° 62 – Junio de 2007



Objetivos:

- **Caracterizar los cambios en el consumo de drogas**
- Permitir la identificación temprana de nuevos patrones y cuestiones emergentes de abuso de drogas

5

Publicación más reciente
CEWG del NIDA - Enero de 2007




Disponibles en
<http://www.drugabuse.gov/pubs>



6






Cuestiones importantes del CEWG – Junio de 2007



- **Tendencia emergente de abuso de polisustancias**
- Alimentada por el uso no médico de medicación de Rx
- **Alto en el crecimiento de la metanfetamina**
- Cocaína: Baja prevalencia y altas consecuencias
- **Reducción de indicadores de heroína**
- Reemplazada por los opiáceos Rx
- **Marihuana: #1 Prevalencia, #2 Consecuencias**
- Crecimiento de éxtasis (MDMA) después de la caída desde 2001












Indicadores de MDMA

- Crecimiento del "éxtasis" en 2006**
- **Caída dramática inversa desde 2001**
 - **Las muertes en Florida aumentaron un 148 % de 27 en 2005 a 67 en 2006**
 - **Aumento en Atlanta, Chicago, Miami, Texas**
 - **Traficantes asiáticos de Canadá**
 - **Más afroamericanos e hispanos**
 - **MDMA frecuentemente adulterada con metanfetamina u otras drogas**



19

Figure 5.4 Past Year Ecstasy Initiates among Persons Aged 12 or Older and Mean Age at First Use of Ecstasy among Past Year Ecstasy Initiates Aged 12 to 49: 2002-2006



* Difference between this estimate and the 2006 estimate is statistically significant at the .05 level.
† Mean-age-at-first-use estimates are for recent initiates aged 12 to 49.


Primeras advertencias del CEWG

- **MDMA – 1984**
- Crack de cocaína – 1985
- **Metanfetamina – 1988**
- Rohipnol – 1992
- **GHB -1994**
- Aumento del éxtasis (MDMA) – 1996
- **Caída del éxtasis (MDMA) - 2001**
- Uso no médico de medicación Rx – 2002
- **Regreso del éxtasis (MDMA) - 2006**

Grupo de Trabajo de Epidemiología de la
Comunidad del NIDA




21



Upfrontin@aol.com

Centro para el
Estudio y la
Prevención del
Abuso de
Sustancias

Nova Southeastern
University



23